

N020 GN urinari N020

NOTE:
 NCCLS Cefazolin, cefuroxime, cefpodoxime, cefprozil, and loracarbef (urinary isolates only) may be tested individually, because some isolates may be susceptible to these agents when resistant to cephalothin. (NCCLS M100)
 utilizzo l'informazione è disponibile in
 assente laboratorio, su richiesta

id	antibiotico	tipo	utilizzo referto	note	equivalenti
AM	Ampicillina	penicillina ampio spettro	sempre		
	Amikacina	aminoglicoside			Gentamicina Tobramicina
AN					Netilmicina
	Cefalotina	cefalosporina 1a generazione	sempre		Cefadroxil Cefalexina Cefapirina
CF					Cefradina Cefaclor Cefadroxil
	Nitrofurantoina	antisetico urinario	sempre	controindicato insufficienza renale	
FT					
	Gentamicina	aminoglicoside	sempre		Tobramicina Amikacina
GM					Netilmicina
	Tobramicina	aminoglicoside	GM-R	dose proporzionale a clearance creatinina	Gentamicina Amikacina
TM					Netilmicina
	Amoxicillina+Clavul.	penicillina a.s. con inibitore beta-latt.	AM-R		
AMC					
	Ceftazidime	cefalosporina 3a generazione	CF-CTX-R		
CAZ					
	Ciprofloxacina	fluorchinolone			
CIP					
	Cefpodoxime	cefalosporina 3a generazione	CF-R	NCCLS	
CPD					
	Cefotaxime	cefalosporina 3a generazione	CF-R	NCCLS	
CTX					
	Cefuroxime	cefalosporina 2a generazione	CF-R	NCCLS	
CXM					
	Cefepime	cefalosporina 4a generazione	CAZ-R	cfr con Cefotaxime per ESBL	
FEP					
	Cefoxitina	cefalosporina 2a generazione			
FOX					
	Meropenem	monobattame			Imipenem
MEM					
	Norfloxacin	fluorchinolone	sempre		
NOR					
	Ofloxacin	fluorchinolone		per UTI complicate, prostatiti, allergie, patogeni resistenti	Ciprofloxacina
OFL					
	Piperacillina	ureidopenicillina	AM-R		
PIP					
	Sulfametossimetrazolo	sulfamidico + inibitore DHF	sempre		
SXT		reduccasi			
	Piperacillina/Tazobactam	ureidopenicillina con inibitore beta-lattamasi		preferibile per insufficienza renale o dopo chirurgia	
TZP					